

Identification du patient

Outil d'aide à l'observance prévention des infections

Identité établissement

CVP ou dispositif sous-cutané



Date :
Lieu de mise en place :
Urgence : Oui Non

Cathéter posé par :

Type de Cathéter :
CVP
Sous cutané

AU MOMENT DE LA POSE

BONNES PRATIQUES D'ANTISEPSIE		PRÉCAUTIONS STANDARD	
Savonnage + rinçage avant application de l'antiseptique	<input type="checkbox"/>	Port de gants pour l'insertion du cathéter	<input type="checkbox"/>
Désinfection des mains immédiatement avant l'insertion du cathéter	<input type="checkbox"/>	Élimination immédiate du mandrin dans un collecteur à OPCT	<input type="checkbox"/>
Désinfection des embouts et des robinets avant leur manipulation	<input type="checkbox"/>		

SURVEILLANCE APRES LA MISE EN PLACE

SURVEILLANCE CLINIQUE QUOTIDIENNE				ÉVALUATION DU MAINTIEN DU CATHÉTÉRISME	
	Matin	Soir	Nuit		
J1				J1	<input type="checkbox"/>
J2				J2	<input type="checkbox"/>
J3				J3	<input type="checkbox"/>
J4				J4	<input type="checkbox"/>
				Date de retrait du cathéter :	
Présence (P) ou absence (A) de signes locaux ou généraux				Il est recommandé, chez l'adulte, de ne pas laisser en place un cathéter plus de 96 heures	

Les items concernant le matériel, la date de pose et d'ablation ainsi que la surveillance doivent être tracés dans le dossier du patient